

Danazol 膠囊

主成分：Danazol
商品名：Ladogal Capsule
中文商品名：療得高膠囊
含量：200 毫克/膠囊

作用：

治療子宮內膜異位，纖維性囊腫性乳房疾病，遺傳性血管水腫。

劑量與用法：

通常每天二次，第一次劑量應在月經期間服用。請遵醫囑服用，不可擅自停藥。

注意事項：

1. 服藥期間定時監測肝功能，做血液檢驗。
2. 月經不規則者請先做懷孕檢驗，需確定未懷孕才可服藥。懷孕或哺乳者請勿服用。服用期間應使用非口服避孕的方法避孕，懷疑懷孕應停止服用並告知醫師。
3. 服藥期間可能月經不規則或無月經。停止服藥後 60 天~90 天會開始規則月經，若無則告訴醫師。
4. 服用本藥前，如果你有偏頭痛，心臟病、肝或腎臟疾病，癲癇，中風，血栓性疾病或乳癌，或同時服用其他藥物，要告知醫師。
5. 服用本藥後會對陽光過敏，應避免在陽光下太久，並作好防曬措施。

忘記服藥時怎麼辦？

想起時儘快服用，若已接近下一次用藥時間，則略過一次，再依照原定時間用藥，絕不可一次服用雙倍劑量。

此藥可能引起的副作用有那些,如果發生了該怎麼辦?

症狀	如何處理
皮疹，皮膚或眼睛泛黃，持續頭痛，持續胃不適、肚子痛、嘔吐，男性發生經常性、延長性或疼痛性陰莖勃起	請立即就醫
痤瘡、頭髮或皮膚油膩，肌肉痙攣，經常疲倦或虛弱，水腫、體重增加，女性乳房縮小、月經不規則、陰蒂肥大、聲音改變、多毛症；男性精子生成減少、睪丸縮小	請儘速就醫
皮膚潮紅，心情改變、神經質，陰道乾澀、癢、灼熱、陰道出血	若症狀持續，請告知醫生

藥品該如何存放?

請參考藥袋說明。